OCT 3 0 1929

EN VENTE CHEZ L'AUTEUR

12896

MÉLANGES
EXOTICO-ENTOMOLOGIQUES

LIBRARY
CAMBRIDGE, MASS.

VINGT-HUITIÈME FASCICULE

(16 mai 1918)

PAR

MAURICE PIC

OFFICIER D'INSTRUCTION PUBLIQUE
CHEVALIER DU MÉRITE AGRICOLE
DIRECTEUR DE L'« ÉCHANGE »
CORRESPONDANT DU MUSÉUM DE PARIS
MEMBRE DE NOMBREUSES SOCIÉTÉS SCIENTIFIQUES
DE FRANCE ET DE L'ÉTRANGER

257

MOULINS
IMPRIMERIE ÉTIENNE AUCLAIRE
ANCIENNE MAISON C. DESROSIERS

1918
Tous droits réservés

COURTES DESCRIPTIONS DIVERSES

Brachypterodrilus n. gen. Corpus subparallelus, capite parum prominulo, oculis maximis, mandibulis gracilibus, articulo ultimo palparum subovato, apice oblique subtruncato ; antennis validis, depressis, apice attenuatis, articulo 2° breve ; thorace transverso, lateraliter marginato ; elytris satis brevibus ; abdomine parum prominulo ; pedibus compressis. — Voisin de *Falsophænopterus* Pic, très distinct, à première vue, par les élytres plus courts, légèrement dépassés par l'abdomen et longuement par les ailes, la tête moins enfoncée dans le prothorax.

Brachypterodrilus pallidipes n. sp. Parum nitidus, piceo-brunnescens, capite antice, antennis ad basin pedibusque pallidis ; thorace fortiter sat dense punctato ; elytris dense ruguloso-punctatis. Long. 4 mill. Ile Banguey.

Rhipidiomorphus n. gen. Corpus latus, subovatus, alatus, oculis magnis, distantibus ; thorace breve, latissimo, marginato ; scutello magno et latissimo ; elytris dehiscentibus, ad basin plicatis ; pedibus gracilibus.

Ce genre est établi pour un curieux petit insecte (malheureusement pas en très bon état de conservation, et dont je n'ai pu étudier tous les membres pour le classer très exactement), de consistance molle, remarquable par son écusson très grand, ses élytres largement séparés l'un de l'autre près de la base; il me paraît devoir prendre place place près de *Pterydrias* Reitt.

Rhipidiomorphus malaccanus n. sp. Subovatus, latus,

parum nitidus, piceus, thorace pedibusque pro parte pallidis ; capite thoraceque latis, illo antice minute attenuato ; elytris minute rugulosis, apice subrotundatis, ad humeros impressis et plicatis. Long. 2 mill. Malacca.

Selasia rhipiceroides v. nov. discoidalis. Elytris in disco mediocre piceo notatis et ad basin late testaceis. Côte d'Ivoire.

Selasia curtipennis n. sp. Oblongus, nitidus, testaceus, elytris nigris, antice triangulariter testaceis, sutura rufescens ; capite valido, oculis magnis ; elytris satis brevibus, pro parte minute sulcatis. Long. 6 mill. Afrique Orientale. — A placer près de *S. pulchella* Gestro.

Drilus testaceipennis n. sp. Minutus, parum elongatus, nitidus, nigro-piceus, capite antice, pedibus elytrisque testaceis ; antennis parum flabellatis, validis, articulo 3° elongato, elytris marginatis. Long. 3 mill. Côte d'Ivoire. Voisin de *D. impressiceps* Pic, antennes différentes, flabellées, prothorax plus foncé, etc.

Pseudothilmanus n. gen. Corpus elongatus ; articulo ultimo palparum acuminato, mandibulis elongatis, oculis magnis ; antennis depressis, articulo 2° breve, 3° parum elongato ; thorace lateraliter marginato, et infra lateraliter excavato ; elytris parum dehiscentibus, lateraliter et apice crasse marginatis, epipleuris brevibus ; pedibus anticis depressis, coxis elongatis ; abdomine breve. — *Drilide* à facies de *Thilmanus* Baudi dont il diffère, à première vue, par les trochanters obliquement articulés sur les femurs.

Pseudothilmanus alatus n. sp. Elongatus, nitidus, pubescens, piceo-brunnescens, articulis 2 primis antennarum, pedibus et abdomine apice pallido testaceis ; thorace breve, lateraliter sinuato ; elytris thorace distincte latioribus, apice attenuatis, unicarinatis, irregulariter punctatis et plicatis. Long. 6 mill. Indes.

Drilothilmanus nov. s. gen. Genere *Pseudothilmanus* s. str. differt articulis 3° et sequentibus antennarum minus latis et paulo elongatis elytrisque apice indistincte dehiscentibus.

Drilothilmanus marginatus n. sp. Elongatus, nitidus, pubescens, niger, pro parte piceus, mandibulis, thorace lateraliter et infra, pedibus pro parte abdomineque apice pallido-testaceis, elytris in disco carinatis, sat regulariter punctato-foveolatis. Long. 5,5 mill. Darjeeling. En outre des antennes et des élytres différents, se distingue du précédent par le prothorax à bord latéral clair, les élytres plus fortement et plus régulièrement ponctués avec les ailes dépassant peu les élytres.

Drilocephalus n. gen. Corpus elongatus ; capite prominulo, elongato et valido, antice truncato, subarcuato et marginato, mandibulis validis, arcuatis et bidentatis ; articulo ultimo palparum elongato, apice subtruncato ; thorace breve, indistincte marginato, angulis posticis acutis ; elytris integris ; femoribus parum depressis, tarsis gracilibus, articulo ultimo maximo ; coxis anticis oblongo-globulosis.

Genre curieux, à tête très proéminente, trochanters subarqués en avant à l'insertion des femurs et pouvant prendre place provisoirement près de *Phrixothrix* E. Ol. dont il est très distinct par les élytres entiers, les antennes simples, les tibias non aplatis, etc. Il a quelques rapports aussi avec *Thelydrias* Mots. ♂.

Drilocephalus pallidipennis n. sp. Elongatus, subparallelus, nitidus, sparse pubescens et hirsutus, rufescens, antennis, pedibus elytrisque pallidioribus, oculis nigris, capite thoraceque mediocre et sparse punctatis ; elytris minute punctatis, postice subplicatis. Long. 8 m. République Argentine.

Stenocladius bicoloripes n. sp. Parum elongatus, nitidus, pallido-testaceus, palpis, antennis pro parte, oculis,

tibiis tarsisque pro parte nigris. Long. 11 mill. Formose. — Voisin de *S. Davidi* Fairm., mais antennes bicolores (noires avec les rameaux roussâtres), bien plus courtes que le corps, tibias plus foncés.

Carphurus Astruci n. sp. Elongatus, nitidus, niger, capite antice, antennis ad basin pedibusque pro majore parte rufescentibus, elytris piceis, ad medium et lateraliter vage pallidioribus. Long. 4 mill. Chine: Kurseong. — A placer près de *C. plagiatus* Ksw.

Attalus keiensis n. sp. Parum elongatus, postice dilatatus, hirsutus, nitidus, minute punctatus, flavus, antennis apice brunnescentibus. Long. 2,5 mill. Ile Kei. — Peut se placer près de *Donceeli* Pic, moins robuste, prothorax non maculé, etc.

Chlorophorus (1) **inhumeralis** n. sp. Angustatus, niger, antennis apice, pedibus pro parte abdomineque apice rufescentibus, elytris albo trifasciatis ; antennis gracilibus, elytris apice fere attingentibus ; thorace elongato, cylindrico, postice albo marginato ; elytris elongatis, apice subtruncatis, ciliatis, albo trifasciatis (fascia prima ad scutellum ascensa, 2° tranversa, postmediana, 3° apicalis) ; pedibus gracilibus ; infra corpore pro parte albo notato. Long. 11 mill. Chine : Yunnan. — Très voisin de *C. gracilipes* Fald., distinct, à première vue, par les élytres dépourvus de macule humérale blanche.

Chlorophorus fainanensis n. sp. Parum elongatus, niger, dense griseo pubescens, thorace nigro maculato, elytris antice nigro subannulatis ad et postmedium nigro fasciatis ; elytris apice lateraliter dentatis ; infra corpore lateraliter albo notato. Long. 12-14 mill. Formose : Fainan. — Voisin de *C. duo* Frm., mais base des élytres avec une

(1) *Chlorophorus obliteratus* Pic (1902) doit être muté en **subobliteratus**, à cause de *C. obliteratus* Gglb. (1889).

demi lunule noire, courbée du côté externe, dessous maculé de blanc, femurs ne dépassant pas les élytres, etc.

Perissus thibetanus n. sp. Angustatus, postice attenuatus, niger, parum nitidus, thorace postice, scutello et infra corpore pro parte albo notatis, elytris albo trifasciatis (fascia postbasalis obliqua, fascia postmedia transversa, fascia apicalis) ; antennis brevibus ; thorace elongato, postice strangulato ; elytris parum elongatis, antice dilatatis, apice subtruncatis ; pedibus gracilibus. Long. 12 mill. Thibet. — Probablement voisin de *C. tristiculus* Frm., qui ne m'est pas connu en nature.

Perissus biluteofasciatus n. sp. Satis robustus, parum nitidus, rugoso-punctatus, niger, thorace albo marginato, elytris ante et post medium luteo-griseo fasciatis, apice griseo notatis. Long. 13 mill. Tonkin. — Ressemble au précédent, mais plus robuste, élytres plus courts, etc.

Demonax subobscuricolor n. sp. Elongatus, subopacus, rufescens, infra corpore thoraceque pro parte obscurioribus, griseo pubescens, supra et infra albo fasciatis ; antennis rufo-testaceis, elongatis, articulis 3-6 spinosis ; thorace elongato, granuloso, lateraliter albo lineato et postice albo marginato ; scutello albo ; elytris elongatis, subparallelis, apice truncatis et lateraliter spinosis, ad basin et apice albo maculatis, ad et post medium albo fasciatis (fasciis ad suturam antice longe ascensis) ; pedibus elongatis, femoribus posticis elytris superantibus ; abdomine albo marginato. Long. 12 m. Chine : Yunnan. — Très distinct de *D. langsonius* Frm., par la coloration plus claire et les dessins des élytres très différents.

Apomecyna niveosparsa v. nov. tonkinea. Satis elongatus, elytris antice et postice maculis niveis plus minusve conjunctis ornatis. Tonkin.

Apomecyna multinotata n. sp. Elongatus, piceus, fulvo pubescens, thorace elytrisque guttis pro parte rotun-

datis, niveis ornatis ; capite sulcato ; prothorace subquadrato, albo maculato ; elytris elongatis, apice oblique-truncatis ; subtus cum pedibus antennisque minute albo notatis. Long. 12 mill. Chine. — Voisin de *A. niveo-sparsa* Frm. par ses macules élytrales, mais élytres obliquement tronqués au sommet et prothorax maculé de blanc.

Apomecyna multinotata v. nov. sinensis. Fulvo-obscuro pubescens, thorace irregulariter albo notato, elytris maculis niveis, plus minusve conjunctis, ornatis. Chine.

Apomecyna maculaticollis n. sp. Elongatus, niger, pro parte luteo pubescens, thorace transverse quadri et elytris multi niveo maculatis ; capite sulcato ; thorace parum elongato ; elytris elongatis, apice oblique truncatis. Long. 9 mill. Formose. — Espèce très distincte de la précédente par le prothorax plus long, bimaculé de blanc de chaque côté du disque et par les macules élytrales plus nombreuses, disposées en partie en quatre rangées dont les 3 antérieures obliques.

Apomecyna excavaticeps n. sp. Satis robustus, parum elongatus, brunnescens, fulvo-griseo pubescens, distincte punctatus ; thorace irregulariter albo notato, elytris ante et post medium late albo maculatis et apice minute albo notatis ; capite valde excavato-sulcato ; articulo 1° antennarum valde dilatato ; thorace subquadrato ; elytris satis brevibus postice attenuatis, apice subrotundato-truncatis. Long. 11 mill. ? Chine. — Elytres moins allongés que chez var. *tonkinea Pic* (dessins élytraux analogues à ceux de cette variété) et très distinct, d'autre part, par la tête fortement creusée entre les yeux et le 1er article des antennes très épaissi.

Cuphotes cinctus Ol. v. nov. bimaculatus. Elytris nigris, antice et postice luteo notatis. Pérou.

Cuphotes cinctus v. nov. obliteratus. Elytris luteis, nigro cinctis. Bolivie.

Cuphotes cinctus v. nov. disjunctus. Elytris luteis, nigro cinctis, ad medium nigro fasciatis, fascia lateraliter interrupta. Brésil.

Cuphotes bifasciatus n. sp. Oblongus, convexus, postice parum dilatatus, nitidus, niger, elytris luteis, nigro cinctis, ad basin et ad medium transverse nigro fasciatis, apice nigro notatis et in disco sparse et paulo nigro maculatis ; thorace breve, lateraliter fere recto, angulis anticis parum prominulis ; elytris parum elongatis, fere impunctatis. Long. 15 mill. Bolivie. — A placer près de *C. maculosus* Guer., dessins noirs des élytres différents.

Cuphotes immaculipes v. nov. boliviensis. Viridimetallicus, elytris rufis, cæruleo foveolatis, ad medium breve et apice sat late cæruleo maculatis, scutello impresso, Bolivie. — Diffère de *immaculipes* Thms., par la coloration foncière élytrale moins pâle, les épaules non maculées de foncé et l'écusson impressionné.

Cuphotes foveolatus n. sp. Elongatus, convexus, parum gibbosus, nitidus, nigro-subcyaneus, elytris rufis, multi et cyaneo foveolatis, ad medium breve subfasciatis et apice minute cyaneo maculatis ; thorace bifoveolato, angulis anticis valde prominulis. Long. 18 mill. Brésil : Jatahy. — Voisin de *C. Castelnaui* Thoms., avec les dessins des élytres différents.

Cuphotes multimaculatus n. sp. Parum elongatus, convexus, minute gibbosus, nitidus, niger, elytris minute lineato-punctatis, luteis, nigro multi maculatis et apice minute nigro notatis ; thorace postice multi impresso, angulis anticis fere rectis. Long. 17-18 mill. Costa Rica. — Très distinct du précédent par la coloration plus pâle des élytres qui, en outre, ne sont pas foveolés de bleu mais multimaculés de noir.

Pœcilesthus interruptus n. sp. Oblongus, satis brevis, convexus, nitidus, niger, elytris luteis, ad basin breve, ad apicem late, nigro notatis et ad medium interrupto fasciatis ; thorace breve, lateraliter angulato, postice foveolato, minute et sparse punctato ; elytris brevibus, apice attenuatis, minute et irregulariter punctatis ; femoribus satis elongatis, apice luteo maculatis. Long. 13 mill. Guyane Française. — Voisin de *P. 4-signalus* Mâkl., mais avec les élytres non striés ponctués, les cuisses maculées, etc.

Pœcilesthus interruptus v. nov. ininterruptus. Fascia media et nigra elytrorum integra. Guyane Française.

Pœcilesthus luteonotatus n. sp. Oblongus, postice minute dilatatus, convexus, nitidus, niger, elytris nigris, ad basin et post medium late luteo maculatis ; thorace breve, lateraliter subsinuato, postice impresso, angulis anticis minute prominulis ; elytris satis brevibus, irregulariter punctatis. Long. 12 mill. Amazones. — Très distinct du précédent par les élytres élargis en arrière, plus distinctement ponctués, la forme du prothorax, etc.

Pœcilesthus humeralis n. sp. Satis brevis et latus, nitidus, rufescens, elytris cyaneis, rufo cinctis, ad humeros et apice rufo maculatis ; thorace lateraliter angulato, in disco postice impresso et foveolato ; elytris minute striato-punctatis, intervallis minute punctatis, post scutellum impressis. Long. 11 mill. Guyane Française .— A placer près de *P. circumcinctus* M.

Pœcilesthus inhumeralis n. sp. Brevis et latus, parum nitidus, rufescens, antennis, tibiis pro parte tarsisque nigris, femoribus nigro annulatis, elytris cyaneis, apice rufo notatis. Long. 8 mill. Amazones. — Très voisin du précédent, prothorax à peine impressionné, élytres moins brillants, à épaules foncées, etc.

Pœcilesthus pectoralis n. sp. Oblongo-ovatus, convexus, nitidus, niger, pectore, abdomine pro parte elytrisque rufis, thorace nigro, minute rufo-notato, illo breve, lateraliter sinuato, angulis anticis fere rectis ; elytris gibbosis, apice attenuatis, minute punctatis et fere indistincte substriatis. Long. 16 mill. Brésil. — Voisin de *P. gibbosus* M.

Pœcilesthus gibbosus v. nov. femoralis. Femoribus ad basin late rufis, capite pro majore parte thoraceque lateraliter minute rufis. Brésil.

Pœcilesthus gibbosus v. nov. notaticeps. Rufescens, antennis pedibusque pro parte nigris, scutello piceo, capite postice nigro maculato et thorace pro parte nigro cincto. Paraguay.

Pœcilesthus elongatus n. sp. Elongatus, parum nitidus, rufo-castaneus, antennis, articulis primis exceptis, scutello, pedibus (femoribus anticis pro parte rufis) et infra corpore in medio nigris ; thorace breve, lateraliter sinuato, angulis anticis fere rectis ; elytris elongatis, parum convexis, minute striato-punctatis ; pedibus mediocribus. Variat capite thoraceque nigris **(v. nov. seminiger)**. Long. 12-15 mill. Brésil : Bahia. — Voisin de *P. rufocinctus* Pic, très distinct par ses élytres de forme plus allongée et concolors.

Pœcilesthus geometricus v. nov. argentinus. Elongatus, subparallelus, nigro-viridescens, elytris minute et pro parte rufo cinctis et in disco breve rufo fasciatis. République Argentine.

Pœcilesthus geniculatus v. nov. reductus. Capite thoraceque pro majore parte rufis, elytris apice late testaceis, breve nigro marginatis et ad suturam postice minute nigro signatis. Brésil.

Pœcilesthus nigromaculatus n. sp. Elongatus, parum nitidus, subconvexus, niger, thorace lateraliter, femori-

bus ad basin et infra corpore plus minusve rufescentibus, elytris rufo-testaceis, aliquot pallidis, pro parte nigro cinctis et nigro multi et diverse maculatis, maculis minutis, subrotundatis ; thorace breve, lateraliter paulo sinuato ; elytris elongatis, pro parte lineato-punctatis. Variat. Thorace, femoribus et infra corpore nigris, v. **atriventris.** Long. 13-14 mill. Brésil. — Voisin de *P. fasciatus* F., très distinct par ses nombreuses macules élytrales.

Pœcilesthus 4-maculatus n. sp. Elongatus, convexus, nudus, flavus, antennis pro parte nigris, elytris in disco antice et ad medium nigro maculatis, minute striato-punctatis, sutura epipleurisque pro majore parte nigris. Long. 9 mill. Guyane Française. — Voisin de *P. Mæklini* Chp., forme un peu plus allongée et élytres ayant chacun 2 macules noires arrondies.

Pœcilesthus subcostatus n. sp. Elongatus, convexus, nitidus, flavus, antennis pro parte, pedibus intermediis posticisque (femoribus ad basin late testaceis) nigris ; elytris nigro trimaculatis, macula postica elongata, sat fortiter striato-punctatis. Long. 9 mill. Guyane Française. — Très voisin du précédent, mais élytres plus nettement striés surtout postérieurement avec une macule supplémentaire noire antéapicale, le prothorax plus finement ponctué et la tête fortement sillonnée.

Pœcilesthus biundulatus n. sp. Minutus, subelongatus, convexus, flavus, antennis ante apicem nigris (aliquot pectore pedibusque pro parte nigris : var. **diversipes**), elytris antice et ad medium nigro undulato-fasciatis, postice in disco brunneo maculatis. Long. 6 mill. Brésil. — Voisin de *P. læviceps* Chp., mais élytres sans fascie antéapicale avec la médiane très arquée et éloignée de la suture.

Pœcilesthus minor n. sp. Minutus, oblongus, convexus, niger, antennis ad basin abdomineque rufis (aliquot pe-

dibus pro parte testaceis: **var. bicoloripes**), elytris rufis, ad medium late nigro fasciatis, fascia antice ad suturam dilatata. Long. 5 mill. Brésil. — Moins allongé que le précédent et de coloration tout autre.

Otocerus multinotatus n. sp. Pro parte rufo-piceus, thorace subæneo, minute et densissime punctato, elytris viridescentibus, multi-testaceo lineatis aut maculatis, fortiter punctato-striatis et costatis. Long. 13-14 mill. Guyane Française. — Très voisin de *O. interruptus* Chp., prothorax plus finement et densément ponctué, moins foncé, élytres à sculpture plus forte.

Otocerus cyanescens n. sp. Oblongo-elongatus, nitidus, cyanescens ; thorace lateraliter fere recto, pro parte marginato, minute punctato ; elytris parum latis, sinuatis, minute striato-punctatis, pedibus satis validis, tibiis arcuatis, posticis dentatis. Long. 13 mill. Maroni. — Espèce très distincte par sa forme et sa coloration.

Otocerus robustus n. sp. Oblongus, nitidus, viridi-cyaneus, thorace lateraliter subarcuato, marginato, minute punctato ; elytris parum latis, sinuatis, minute striato-punctatis ; pedibus validis, tibiis arcuatis. Long. 13 mill. Amérique Méridionale. — Plus robuste que le précédent avec les tibias postérieurs non dentés, etc.

Otocerus pallidipennis v. nov. lineatus. Thorace nigro, elytris testaceis, nigro lineato punctatis. Brésil.

Otocerus s. gen. nov., Plicatocerus. Oblongus, elytris in disco tranverse plicatis, epipleuris antice valde laxatis; thorace antice fortiter transverse sulcato. — Ce nouveau sous-genre est établi pour l'espèce singulière *impressipennis* Chp., décrite comme *Otocerus* M.

Microtocerus n. gen. Antennis longissimis, articulis 3° satis elongato, 4° et sequentibus valde elongatis, depressis, pro parte pilosis ; elytris ad basin impressis, epipleuris antice laxatis ; tibiis anticis dentatis, posticis

ad basin subdilatatis, tarsis longissimis. Genre voisin de *Otocerus* M. par le 3e article des antennes plus court que le 4e, mais ces organes sont très longs, non dentés, enfin les tibias présentent une structure particulière.

Microtocerus grandicornis n. sp. Parum elongatus, convexus, nitidus, viridescens, infra corpore femoribusque ad basin rufescentibus, thorace lateraliter subarcuato, densissime punctato ; elytris apice attenuatis, sat fortiter striato-punctatis. Long. 9 mill. Brésil.

Pseudotocerus gracilimembris n. sp. Angustatus, nitidus, nigro-viridescens, elytris cyaneis, ad basin rufo-testaceo maculatis et ad medium rufo-testaceo fasciatis ; thorace breve, densissime punctato, postice lateraliter submarginato ; elytris fortiter striato-punctatis ; pedibus intermediis et posticis longissimis ; antennis gracilibus. Long. 15 mill. Brésil. — Voisin de *P. longipes* Luc., distinct par la forme des élytres moins parallèle, ainsi que par leurs dessins roux plus réduits et formant des bandes.

Strongylium nov. s. gen., Pœcilesthostrongylium. Corpus robustus ; thorace antice in medio arcuato, sulcato, lateraliter valde dentato, tuberculato ; elytris apice distincte marginatis. — Sous-genre établi pour l'espèce suivante.

Strongylium amazonicum n. sp. Oblongus, nitidus, cyaneus ; thorace breve, fortiter pro parte sat sparse punctato et diverse impresso ; elytris latis, substriato-punctatus, punctis antice validioribus ; pedibus mediocre elongatis. Long. 16 mill. Amazones.

Strongylium semiopacum n. sp. Oblongo-elongatus, nigro-cyaneus aut cyaneo-viridescens ; capite thoraceque densissime punctato-rugulosis, opacis, illo lateraliter tuberculato ; elytris nitidis, irregulariter impressis et plicatis, abdomine metallico. Long. 10-12 mill.

Guyane Française. — Voisin de *S. cariosum* M., distinct, à première vue, par la coloration bleuâtre et l'abdomen entièrement foncé.

Strongylium bahianum n. sp. Elongatus, convexus, nitidus, nigro-cyaneus, antennis validis ; thorace subquadrato, lateraliter fere marginato, dense punctato : elytris elongatis, lineato-foveolatis, apice pro parte striato-punctatis ; pedibus brevibus. Long. 8 mill. Brésil : Bahia. — Peut se placer près de *S. chalceum* M., de forme bien plus allongée, prothorax différent et coloration bleutée.

Strongylium triundulatum n. sp. Oblongo-elongatus, parum nitidus, nigro-æneus ; thorace breve, lateraliter sinuato et minute tuberculato, supra inæquale et rugoso punctato : elytris satis latis, subparallelis, late et irregulariter excavatis et plicatis, pro parte grosse punctatis, longitudinaliter undulato tricarinatis. Long. 14 mill. Pérou. — Espèce très distincte par sa sculpture élytrale et pouvant prendre place près de *S. fulminans* M.

Strongylium excavatipenne n. sp. Satis elongatus, parum nitidus, niger, elytris æneis ; thorace breve, lateraliter marginato et dentato, in medio sulcato, fortiter sat dense punctato, pro parte impresso ; elytris parum latis, subparallelis, irregulariter excavatis et plicatis, transverse et longitudinaliter plicatis, apice sparse et grosse punctatis. Long. 12 mill. Maroni. — Voisin du précédent, prothorax différent, élytres plus allongés, à sculpture non pareille.

Strongylium pulchripenne n. sp. Oblongus, nitidus, cyaneo-violaceus, elytris purpureo-cupreis, pro parte viriditinctis ; capite thoraceque dense punctatis, illo lateraliter subarcuato ; elytris latis, antice grosse et irregulariter foveolatis, postice minute punctatis. Long. 13 mill. Brésil. — Jolie espèce, pouvant prendre place près de

S. erythropterum M., très distincte par son prothorax non denté, ses élytres plus courts et de couleur différente.

Strongylium cyaneitarse n. sp. Elongatus, convexus, rufescens, pro parte viridi-metallicus aut ænescens, antennis nigris, articulis primis metallicis, tarsis nigro-cyaneis ; antennis apice latissimis ; thorace lateraliter subarcuato ; elytris parum latis, foveolatis, apice carinatis ; pedibus satis brevibus. Long. 11 mill. Amazones. — Voisin de *S. conicicolle* M., par sa sculpture élytrale, très différent par son prothorax plus court, ses fortes antennes et sa coloration.

Strongylium subiridescens n. sp. Elongatus, satis nitidus, nigro viridescens, elytris abdomineque rufis ; thorace breve, lateraliter minute tuberculato, supra minute impresso et disperse punctato ; elytris parum convexis, elongatis, apice subacuminatis, minute striato-punctatis, intervallis minutissime sat dense punctatis ; pedibus mediocribus, tibiis pro parte sinuatis. Long. 13 mill. Brésil : Blumenau. — A placer probablement près de *S. denticulatum* M., qui ne m'est pas connu en nature.

Strongylium Leseleuci n. sp. Oblongo-elongatus, parum nitidus, subconvexus, niger, abdomine rufo, capite ad oculos minute rufo notato, elytris pallidis, antice et ad medium nigro undulato-fasciatis, apice longe nigro maculatis ; capite foveolato ; thorace breve, lateraliter subarcuato, minutissime et sparse punctato ; elytris parum elongatis, minute lineato punctatis. Long 13 mill. Brésil. — Peut se placer près de *S. ornatum* M., distinct par l'abdomen entièrement roux, les dessins noirs des élytres différents.

Strongylium punctatolineatum n. sp. Oblongo-elongatus, convexus, nitidus, rufus, antennis, scutello, pedibus et infra corpore pro majore parte nigris ; thorace transverso, lateraliter subarcuato, minute et sparse punctato ;

elytris apice acuminatis, minute lineato-punctatis ; pedibus satis brevibus ; abdomine nigro apice testaceo. Long. 13 mill. Brésil. — Voisin de *S. Chevrolati* M., mais avant-corps roux, élytres plus allongés, etc.

Strongylium 14-maculatum n. sp. Oblongus, convexus, nitidus, rufescens, capite post oculos et thorace in disco nigro notatis, elytris pallidis, singulo 7° (1, 3, 3) nigro maculatis, antennis, scutello pedibusque, femoribus pro parte rufis exceptis, nigris ; thorace transverso, lateraliter fere recto, submarginato ; elytris latis, apice breve attenuatis, minute striato-punctatis. Long. 14 mill. Bolivie. — Voisin de *S. maculicolle* Chp., prothorax plus largement roux, élytres à macules plus nombreuses et plus petites, etc.

Strongylium viridifasciatum n. sp. Angustatus, nitidus, viridi-metallicus, antennis ad medium nigris, pedibus testaceis, femoribus intermediis et posticis pro majore parte viridescentibus, tarsis nigris ; elytris ad basin et ad medium transverse pallido fasciatis, his fortiter striato-punctatis. Long. 14 mill. Bogota. — A placer près de *S. aulicum* M., distinct, à première vue, par les antennes bicolores et les bandes élytrales complètes, etc.

Strongylium difformipes n. sp. ♂ Angustatus, nitidus, viridi-metallicus, elytris pro parte viridi-cyaneis, antennis ad medium nigris, femoribus anticis tibiisque testaceis, tarsis nigris ; elytris ad basin late et ad medium testaceo fasciatis, fasciis lateraliter junctis ; tibiis anticis dilatatis, dentatis et spinosis, posticis curvatis et deplanatis. Long. 16 mill. Brésil : Jatahy. — Espèce très distincte par la particulière structure de ses tibias.

Strongylium simplicipes n. sp. Satis angustatus, nitidus, viridi-cyaneus, antennis ad medium nigris, femoribus anticis, femoribus intermediis et posticis apice testaceis, tarsis nigris, elytris ad basin late et ad medium testaceo fasciatis, fasciis lateraliter junctis. Long. 18 mill. Panama.

— Voisin du précédent, mais tibias simples, élytres à ponctuation plus large, etc. A placer près de *S. decoratum* M.

Strongylium tucumanum n. sp. Angustatus, nitidus, cyaneus, antennis, femoribus anticis tibiisque testaceis ; elytris rubro-testaceo bifasciatis, fasciis lateraliter junctis. Long. 15-16 mill. République Argentine : Tucuman. — De forme un peu moins étroite que le précédent avec la coloration des membres différente.

Strongylium bisbinotatum n. sp. Elongatus, subparallelus, nitidus, viridi-cyaneus, antennis pedibusque testaceis, elytris ad basin et ad medium rufo maculatis ; thorace subquadrato, lateraliter immarginato ; elytris dense punctato-plicatis, substriatis. Long. 12 mill. Brésil. — Très distinct par ses macules isolées sur la suture et latéralement. A placer près de *S. aulicum* M.

Strongylium purpureohumerale n. sp. Angustatus, subparallelus, nitidus, purpureo-violaceus, pedibus pro parte et infra corpore viridescentibus, antennis testaceis ; elytris ad basin et post medium flavo-luteo maculatis, humeris purpureo maculatis infra corpore dense argente pubescente. Long. 10 mill. Brésil. — Espèce voisine de *S. flavicorne* M., mais élytres largement flaves antérieurement avec les épaules métalliques.

Strongylium militare v. nov., Augustalisi. Nigro-purpureus, pedibus metallicis, elytris in disco et lateraliter luteo lineatis et postice luteo fasciatis, fascia ad lineam marginalem juncta. Brésil.

Strongylium longelineatum n. sp. Angustatus, subparallelus, nitidus, viridis, pro parte æneus aut cupreus, elytris violaceo-pupureis, in singulo ad suturam late, et lateraliter anguste, luteo lineatis, antennis testaceis. Long. 8 mill. Brésil. — A placer près de *S. striolatum* M.

Strongylium Le Moulti n. sp. Elongatus, nitidus, viri-

dis, pro parte purpureo, metallicus, antennis apice pedibusque (femoribus pro parte metallicis) testaceis, elytris ad basin in disco sat longe et lateraliter luteo lineatis et post medium luteo fasciatis ; thorace lateraliter marginato ; elytris fortiter striato-punctatis. Long. 10 mill. Brésil. — A placer près de *S. flavofasciatum*. Cast.

Strongylium angustipenne n. sp. Valde angustatus, subparallelus, nitidus, viridi-cœruleus, elytris ad basin et post medium lateraliter rufo maculatis, antennis pedibusque metallicis Long. 9 mill. Brésil. — Espèce bien distincte par sa forme élytrale étroite et allongée jointe à ses 4 macules. Peut se placer près de *S. ustulatum* M.

Strongylium ustulatum v. nov. subustulatum. Elytris antice longe testaceis, ad basin pallidioribus, apice mediocre metallicis. Brésil.

Strongylium goyasense n. sp. Elongatus, subparallelus, nitidus, cyaneus, antennis, ad basin nigris, tibiisque plus minusve testaceis, elytris ad basin testaceo maculatis et postice vage violaceo fasciatis : thorace breve, lateraliter fere recto, in disco parum dense punctato ; elytris striato-punctatis, pro parte plicatis. Long. 22 mill. Brésil : Goyas. — A placer près de *S. ustulatum* M.

Strongylium luteomaculatum n. sp. Elongatus, subparallelus, nitidus, cyaneus, antennis, pedibus anticis pro majore parte et femoribus ad basin vage testaceis, elytris, his satis brevibus, subviolaceis, ad basin luteo maculatis ; thorace ruguloso-punctato. Long. 8 mill. Brésil : Goyas. — Voisin du précédent, élytres plus courts, prothorax plus densément et rugueusement ponctué, etc.

Strongylium pallidicorne n. sp. Angustatus, nitidus, cyaneus, elytris subviolaceis, antennis pallidis ; thorace elongato, subcylindrico ; elytris angustatis, apice subacuminatis, striato-punctatis et plicatis, apice breve striato-

carinatis ; pedibus elongatis. Long. 12 mill. Amazones. — Voisin de *S. ustulatum* M., par sa forme, distinct, à première vue, par sa coloration générale bleue.

Strongylium X-notatum n. sp. Oblongus, nitidus, viridis, pro parte cupreus, antennis, tibiis pro parte femoribusque ad basin testaceis ; elytris luteo signatis, his striato-punctatis, antice grosse punctatis ; thorace marginato ; pedibus satis brevibus. Long. 17 mill. Brésil. — Paraît voisin de *S. figuratum* M., et dictinct par les dessins jaunes des élytres qui sont formés d'une macule antérieure en forme de X, d'une fascie médiane sinuée et d'une bordure latérale antérieure.

Strongylium mirum n. sp. Parum elongatus, nitidissimus, viridi-metallicus, elytris cyaneis, ad basin et ad medium luteo fasciatis, fasciis lateraliter connexis, antennis pedibusque testaceis, femoribus apice plus minusve metallicis ; thorace breve, sparse punctato, in disco foveolato, lateraliter marginato et fere recto ; elytris minute striato-punctatis . Long. 12 mill. Bolivie. — Voisin de *S. bifasciatum* M., très distinct par le prothorax foveolé, les stries des élytres peu marquées, etc.

Strongylium arcuatipes n. sp. Angustatus, nitidus, viridi-metallicus, pro parte cupreus, elytris ad basin et ad medium luteo fasciatis, fasciis lateraliter connexis, antennis pedibusque testaceis, his longissimis, femoribus anticis curvatis. Long. 12 mill. Brésil. — Plus allongé, avec les élytres plus fortement ponctués, que le précédent, etc.

Strongylium 6-maculatum v. nov. bisbimaculatum. Elytris testaceo 4-maculatis, pedibus pro majore parte nigris. Brésil.

Strongylium submucronatum n. sp. Angustatus, nitidus, nigro-æneus, antennis pedibusque rufescentibus, femoribus pro parte brunnescentibus, tarsis piceis ; thorace satis elongato, sat fortiter et sparse punctato ; elytris angus-

tatis, ,apice submucronatis, substriatis sed sat fortiter lineato-punctatis, apice fere lævibus. Long. 14 mill. Brésil. — Paraît voisin de *S. mucronatum* M., mais élytres non épineux au sommet et prothorax non tuberculé sur les côtés.

Strongylium singulare n. sp. Modice elongatus, antice et postice attenuatus, nitidus, viridescens, femoribus ad basin longe testaceis, abdomine pro parte rufo tincto ; capite inter oculos foveolato ; thorace breve, lateraliter fere recto, ad medium transverse impresso et postice impresso, minute et sparse punctato ; elytris ad basin latis et convexis, postice valde attenuatis et subdeplanatis, minute striato-punctatis ; pedibus parum elongatis. Long. 14 mill. Brésil. Bahia. — Espèce de forme particulière pouvant prendre place provisoirement près de *S. Germari* M.

Strongylium Wagneri n. sp. Oblongo-subovatus, antice et postice attenuatus, nitidus, viridi-metallicus, antennis pedibusque nigris aut subæneis, femoribus ad basin rufo notatis ; capite thoraceque dense et ruguloso punctatis, illo lateraliter fere recto, marginato ; elytris ad basin latis et convexis, postice attenuatis, fortiter striato-punctatis, striis apice pro parte aut minute punctatis ; pedibus elongatis. Long. 11 mill. République Argentine. — Voisin de *S. Germari* M., mais pattes plus foncées, élytres verts, etc.

Strongylium bogotense n. sp. Parum elongatus, nitidus, obscure æneo-viridescens ; thorace lateraliter sinuato, fere recto et subarcuato marginato, supra multi impresso ; elytris subparallelis, apice attenuatis, fortiter striato-punctatis, intervallis convexis ; pedibus satis validis. Long. 13 mill. Bogota. — Voisin de *S. picicorne* Frm., prothorax de forme et sculpture différente, pattes plus robustes, yeux un peu moins rapprochés.

Strongylium purpureopunctum n. sp. Oblongo-elongatus, nitidus, viridi-subæneus, elytris viridis, substriato et

purpureo punctatis, antennis nigris ; capite thoraceque dense et ruguloso-punctatis, illo supra multi impresso et lateraliter tuberculato ; elytris subparallelis, apice attenuatis, minute striato-punctatis, punctis rubro tinctis, pro parte validis, intervallis parum convexis ; pedibus satis validis. Long. 12 mill. Guyane : Maroni. — Moins large que le précédent, avec le prothorax différent et caractérisé, entre les espèces voisines, par sa ponctuation élytrale pourprée.

Strongylium meridanum n. sp. Elongatus, nitidus, æneo-viridescens, labro palpisque testaceis ; thorace breve, lateraliter subangulato, fortiter et irregulariter punctato, medio subsulcato ; elytris fortiter punctato-striatis, intervallis 3, 5, 7 latioribus, subconvexis, lævibus. Long. 12 mill. Merida. — Voisin de *S. costulatum* M., en diffère par les intervalles des élytres non cuivreux, les palpes testacées, etc.

Strongylium maroninum n. sp. Augustatus, nitidus, æneus, elytris viridi-subæneis, antennis tarsisque nigris ; thorace satis breve, in disco fortiter et sparse punctato, sulcato ; elytris subparallelis, ad basin transverse depressis, striato-punctatis, intervallis alternis paulo latioribus, subconvexis, ad basin punctato-plicatis. Long. 7 mill. Guyane : Maroni. — Voisin de *S. alternans* M., sculpture élytrale différente.

Strongylium subalternatum n. sp. Elongatus, nigro-subæneus, capite antice pedibusque pro majore parte rufis ; capite thoraceque densissime punctatis, subopacis, illo lateraliter sinuato, minute tuberculato ; elytris subparallelis, fortiter punctato-crenulatis, intervallis costatis, præsertim 3, 5, 7. Long. 7 mill. Maroni. — Voisin de *S. 6-maculatum* M., élytres à côtes plus marquées, immaculés, prothorax différent, etc.

Strongylium bilineatocolle n. sp. Parum elongatus, nitidus, nigro-subæneus, elytris nigro-cyaneis, capite tho-

raceque pro parte, vitta discoidalis sinuata elytrorum, femoribus pro parte abdomineque rufo-testaceis ; thorace breve, ruguloso, lateraliter sinuato et minute tuberculato, elytris ad basin depressis, punctato-crenulatis, intervallis costatis. Long. 7 mill. Maroni. — Voisin du précédent, mais élytres faiblement déprimés antérieurement et ornés d'une bande discale testacée, prothorax largement marqué de testacé de chaque côté du disque, etc.

Strongylium cyaneomaculatum n. sp. Oblongus, nitidus, rufescens, pro parte iridescens, pectore, macula postica thoracis, maculis duabus elytrorum, femoribus apice nigro-cyaneis aliquot subpurpureis, antennis pro majore parte tarsisque piceis ; thorace lateraliter marginato, sparse punctato ; elytris diverse lineato-punctatis. Long. 10-11 mill. Brésil. — Jolie espèce, très distincte par sa coloration, les 2 grosses macules des élytres et la ponctuation de ces organes particulière, plus fine sur les parties foncées que sur les parties claires. Peut se placer près de *S. chontalense* Chp.

Strongylium infemorale n. sp. Elongatus, nitidus, viridi-subæneus, coxis, abdomineque pro parte rufo tinctis ; thorace breve, rugoso, lateraliter dentato, in disco impresso ; elytris elongatis, fortiter striato-punctatis, intervallis angustis, pro parte carinatis. Long. 14 mill. Bogota. — Voisin de *S. denticolle* Sharp., forme plus étroite, élytres plus régulièrement sculptés et cuisses foncées.

Strongylium diversipenne n. sp. Angustatus, nitidus, viridi-subæneus, palpis testaceis, femoribus ad basin abdomineque pro parte rufescentibus ; thorace lateraliter subarcuato, fere marginato, ruguloso-punctato ; elytris angustatis, apice attenuatis, ad basin striato-punctatis et costatis, ad medium diverse punctatis et pro parte plicatis, postice pro majore parte striato-punctatis et carinatis. Long. 10 mill. Brésil. — Espèce caractérisée par la sculpture des élytres différente suivant les parties de ces orga-

nes, sculpture la rapprochant de *S. exaratum* Chp., ce dernier est plus large, plus atténué postérieurement, etc.

Strongylium viridipunctatum n. sp. Parum elongatus, et satis latus, nitidus, nigro-æneus, pro parte viridescens, elytris æneo-cupreis, viridi striato-punctatis, palpis, antennis pedibusque pro parte rufis ; antennis satis validis, articulo 2° latissimo ; thorace transverso, lateraliter sinuato et submarginato, supra sulcato et impresso, fortiter et disperse punctato ; elytris latis, parum elongatis, apice attenuatis, striato-punctatis, striis viridibus, intervallis satis latis, apice subcarinatis, æneo-cupreis ; pedibus parum elongatis. Long. 17 mill. Brésil. — Peut se placer près de *S. eminens* M., plus large, antennes rousses, etc.

Strongylium atripenne n. sp. Angustatus, postice attenuatus, nitidus, niger ; capite thoraceque dense punctatis, illo lateraliter tuberculato ; elytris sat fortiter striato-punctatis, punctis apice subtilioribus. Long. 17 mill. Brésil : Jatahy. — Voisin de *S. mœreus* M., en diffère, et à première vue, par l'avant-corps brillant et le prothorax tuberculé.

Strongylium peruvianum n. sp. Elongatus, nitidus, niger, femoribus pro majore parte rufis, articulo ultimo antennarum apice testaceo ; thorace lateraliter et antice sinuato, in disco sulcato, fortiter et pro parte sat sparse punctato ; elytris striato-punctatis, punctis apice subtilioribus. Long. 20 mill. Pérou. — Voisin de *S. punctato-striatum* M., mais plus noir, prothorax sillonné, etc., diffère, en outre, du précédent, par la forme moins étroite, les fémurs largement roux et le prothorax différent.

Strongylium bolivianum n. sp. Elongatus, nitidus, viridi-metallicus ; antennis gracilibus, apice rufescentibus ; thorace lateraliter subarcuato, in disco late impresso, diverse sat fortiter punctato ; elytris parum latis, elongatis, subparellelis, apice attenuatis, lineato-punctatis, punctis, apice subtilioribus ; pedibus elongatis. Long. 17 mill. Bo-

livie. — Peut se placer près de *S. viridipes* M.. plus allongé, avec la ponctuation élytrale plus régulière et plus fine postérieurement.

Strongylium subtilepunctatum n. sp. Satis elongatus, nitidus, nigro-æneus, pro parte viridescens ; thorace lateraliter subarcuato, in disco mediocre et diverse impresso, sparse punctato ; elytris parum latis, subparallelis, apice attenuatis, minute lineato-punctatis, apice fere impunctatis; pedibus elongatis. Long. 18 m. Bolivie. — Très distinct du précédent, ainsi que des autres espèces voisines, par la fine ponctuation sériale des élytres.

Strongylium Claveri n. sp. Satis elongatus nitidus, nigro-cupreus, pro parte viridescens ; thorace lateraliter dentato, in disco valde et irregulariter impresso, sat dense punctato ; elytris parum latis, subparallelis, apice attenuatis, minute lineato-punctatis. apice fere impunctatis : pedibus elongatis. Long. 18-19 mill. Colombie : Ibague. — Très voisin du précédent par sa ponctuation éytrale et facilement séparable par la structure de son prothorax.

Strongylium lucidicolle n. sp. Parum elongatus, nitidus, supra cyaneo-viridescens, infra viridis, antennis pedibusque cyaneis ; thorace lateraliter subarcuato, fortiter pro parte sparse punctato ; elytris parum latis, subparallelis, apice attenuatis, antice lineato-punctatis, apice punctato-striatis ; pedibus satis elongatis. Long. 18 mill. Brésil. — Peut se placer près de *S. lucidum* M., ponctuation du prothorax plus forte, celle des élytres différente, en outre de la coloration.

Strongylium diversicolle n. sp. Elongatus, nitidus, viridi-cyanescens, capite thoraceque pro parte purpureis, antennis apice tarsisque nigris ; thorace lateraliter arcuato et marginato, mediocre, pro parte sat sparse, punctato ; elytris satis angustatis, apice attenuatis, antice lineato-punctatis, apice striatis ; pedibus satis brevibus,

Long. 16 mill. Brésil. — Voisin de *S. festivum* M., coloration différente, prothorax non sillonné, etc.

Strongylium subopacipenne n. sp. Angustatus, viridi-metallicus, abdomine apice testaceo, elytris subopacis, obscure viridi-purpureis, antennis apice nigris ; thorace satis elongato, lateraliter sinuato, angulis posticis prominulis, fortiter sat sparse punctato ; elytris angustatis, apice attenuatis, minute striato-punctatis, punctis pro majore parte majoribus ; pedibus parum elongatis. Long. 14 mill. Brésil. — Peut se placer près de *S. varians*. Chp., coloration différente et élytres plus brusquement rétrécis à l'extrémité.

Strongylium acropteriforme n. sp. Angustatus, apice valde attenuatus, nitidus, rufescens, pro parte iridescens, capite thoraceque viridibus, antennis nigris, pedibus testaceis, geniculis tarsisque nigris ; antennis satis gracilibus ; thorace lateraliter subarcuato, minute tuberculato, fortiter sat dense punctato ; elytris angustatis, elongatis, valde attenuatis, apice subacuminatis, minute striato-punctatis, punctis pro majore parte majoribus ; pedibus parum elongatis. Long. 11 mill. République Argentine. — A placer près de *S. mundum* M., en diffère au moins par les genoux foncés et la coloration.

Leiochrinus ruficolor n. sp. Hemisphæricus, parum convexus, nitidus, rufo-testaceus ; thorace antice integro ; elytris fere impunctatis, antice late marginatis. Long. 5 mill. Bornéo. — A placer près de *L. rufofulvus* W.

Leiochrodes tenebrosus v. nov. semirufus. Rufescens, elytris nigris, lateraliter minute rufo notatis. Bornéo.

Leiochrodes discicolis v. nov. niasensis. Subovatus, parum convexus, nitidus, rufescens, thorace in disco picescente, sutura nigro-picea, antennis apice nigris. Ile Nias.

TABLE

POUR LE VINGT-HUITIÈME FASCICULE

Page.

Courtes Descriptions diverses 1